

De overige bijwerkingen:

- Griepachtige verschijnselen zoals koorts, rillingen, pijn in de spieren en gewrichten en hoofdpijn (bij > 30% van de patiënten). Deze treden op binnen de eerste drie dagen na de toediening van Aclasta®. U kan hiervoor best een pijnstillert innemen, bij voorkeur paracetamol. Deze bijwerkingen zijn het meest uitgesproken na het eerste infuus en nemen af bij elke volgende toediening.
- Pijn in de mond, tanden en kaak, zwelling of wondjes in de mond, een verdoofd of zwaar gevoel in de kaak, of het los raken van een tand zijn waargenomen bij patiënten die met Aclasta® werden behandeld.
- Allergische reacties waaronder zeldzame gevallen van bemoeilijkte ademhaling, netelroos en angio-oedeem (zoals een opgezwollen gezicht, tong of keel).
- Nierfunctiestoornissen.
- In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke botbreuk van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden.

Neem steeds in elk van deze gevallen contact op met uw behandelende arts of het daghospitaal.

Meer weten?

Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop van de toediening van een Aclasta® infuus.

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen zou hebben, aarzel dan niet om deze aan uw behandelende arts of verpleegkundige voor te leggen.

Contactgegevens

De dageenheid campus Bornem is te bereiken op 03 890 17 43, alle werkdagen van 08u00 tot 18u00.

De dageenheid campus Willebroek is te bereiken op 03 860 32 43, alle werkdagen van 07u00 tot 18u00.

Graag contact met ons opnemen indien u niet aanwezig kan zijn op de gemaakte afspraak.

Dagziekenhuis Geneeskunde
Bornem en Willebroek

Aclasta infuus

Informatiefolder

Sint-Jozefkliniek

Campus Bornem
Kasteelstraat 23 - 2880 Bornem

Campus Willebroek
Tisseltsesteenweg 27 - 2830 Willebroek



Geachte mevrouw, mijnheer,

In overleg met uw behandelende arts werd besloten u door te verwijzen naar het daghospitaal van ons ziekenhuis voor de toediening van een Aclasta® infuus. Aclasta® bevat 5 mg zoledroninezuur, een bisfosfonaat, dat via intraveneuze weg wordt toegediend.

Waarom Aclasta®?

Aclasta® wordt toegediend aan patiënten met een verhoogde kans op botbreuken door osteoporose of botontkalking. Het bindt zich aan het bot en voorkomt overmatige botafbraak, waardoor het bot de kans krijgt weer normaal op te bouwen. De gebruikelijke dosis Aclasta® of zoledroninezuur is 5 mg. Het is belangrijk dat u deze behandeling combineert met een dagelijkse inname van calciumsupplementen en vitamine D.

Aclasta® wordt jaarlijks toegediend, steeds op doorverwijzing van uw behandelende arts.

Verloop van de opname

Nadat u zich ingeschreven heeft aan de receptie, wordt u ontvangen op het daghospitaal. Daar wordt u een plaats toegewezen. Vervolgens wordt uw identificatie en thuismedicatie overlopen. Het is aangewezen dat u steeds een lijstje met de huidige thuismedicatie bij de hand hebt en elke wijziging in uw thuismedicatie vermeldt aan de verpleegkundige. Vermeld altijd allergieën en het gebruik van bloedverdunners.

In het bijzonder voor de toediening van Aclasta® is het belangrijk dat u vermeldt:

- of u last had of heeft van pijn, een zwelling van of gevoelloosheid van de kaak of van loszittende of ontstoken tanden of kiezen. Een tandartsbezoek voorafgaand aan de Aclasta toediening is aangewezen.
- of uw bijschildklieren in uw hals geheel of gedeeltelijk operatief zijn verwijderd.
- of u een voorgeschiedenis heeft van nierproblemen (uw nieren moeten goed functioneren om het overtollige Aclasta®, dat uw botten niet nodig hebben, uit te kunnen scheiden).
- of u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Voor de start van het infuus wordt steeds de calciumspiegel in het bloed gecontroleerd door de verpleging en/of arts. Bij voorkeur gebeurt deze bepaling (via bloedname) reeds bij uw huisarts kort voor de afgesproken hospitalisatiedatum. Zoniet kan dit nog gebeuren in het ziekenhuis voor de toediening van het infuus. Hierbij dient u dan wel rekening te houden met enige wachttijd vooraleer de uitslag bekend is.

Vervolgens wordt uw bloeddruk en pols gemeten. De verpleegkundige prikt dan de katheter en start het Aclasta® infuus. De standaard infusie snelheid bedraagt 30 minuten. Op het einde van de infuustijd wordt uw bloeddruk en pols opnieuw gecontroleerd en wordt vervolgens het infuus verwijderd.

De behandelende arts staat steeds in contact met het daghospitaal tijdens de behandeling.

U hoeft voor deze infuustherapie niet nuchter te zijn. Koffie, thee en water zijn vrij verkrijgbaar op het daghospitaal.

Bijwerkingen van de behandeling

Vooraleer Aclasta® kan worden toegediend moet er voldaan zijn aan 2 voorwaarden:

- Allereerst is het belangrijk dat u vóór het infuus voldoende drinkt (minstens 1 tot 2 glazen). Zoniet kunnen er verschijnselen van uitdroging optreden.
- Tevens moet er steeds op voorhand een bloedname gebeuren waaruit blijkt dat uw calciumspiegel niet verlaagd is; dit kan via uw huisarts of behandelende specialist in het ziekenhuis verlopen. Aclasta® zorgt namelijk voor een tijdelijke daling van het calciumgehalte in uw bloed waardoor toediening bij een te laag calciumgehalte tot bijwerkingen kan leiden zoals spierkrampen en tintelingen, vooral rond de mond.